MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA

LUTTE CONTRE LE SIDA

CENTRE DES OPERATIONS D'URGENCE DE SANTE PUBLIQUE

RAPPORT DE SITUATION SUR L'EPIDEMIE DE CHOLERA AU BURUNDI

SITREP N° 015 **RÉDIGÉ ET PUBLIÉ LE 19-01-2023**

DONNEES DU 19-01-2023

MISE A JOUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

Cas par district  DS Nord:**37** DS Centre:**02** DS Isale:21 DS Sud:**02** DS Cibitoke:21	**Nombre de cas** **Cumul :83** **Hôspitalisés:03** 	**Décès**  **Nouveau:00** **Cumul:01** **NC:00**
Guéris  Nouveau:**02** Cumul:79		

Note : *Six cas suspects rapportés avant-hier ont été confirmés non cas par le laboratoire national et ont été retiré du cumul ci haut.*

I. Contexte épidémiologique du Burundi

- Le Burundi fait face chaque année à des flambées épidémiques de choléra dans certaines localités.
- De la 48ème à la 52ème semaine épidémiologique de l'année 2022, des cas cholera ont été rapporté dans les districts sanitaires de Cibitoke, Bujumbura Nord et Bujumbura centre.
- A la date du 01Janvier 2023, l'épidémie a été déclarée.



Figure 1 : Localisation des districts sanitaires/provinces en épidémie de choléra en 2023

II. Evolution épidémiologique du cholera

II.1 Notification des cas

En date du 19 Janvier 2023, cinq districts sanitaires sont déjà touchés dont **Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud et Isale.**



Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=83)

II.2. Distribution des cas par aire de responsabilité

Les aires de responsabilité qui enregistrent le plus de cas sont celles de BUKIRASAZI I (DS Bujumbura Nord), de KAJAGA (DS Isale), Gatumba et MPARAMBO I (DS Cibitoke) avec respectivement 30, 8 et 7 cas confirmés.

Tableau I : Répartition des cas par aire de responsabilité au 19 Janvier 2023

PROVINCE SANITAIRE	DISTRICT SANITAIRE	AIRE DE RESPONSABILITE	NOMBRE DES CAS	NOMBRE DE DECES
BUJUMBURA MAIRIE	BUJUMBURA CENTRE	BUYENZI	1	
		BWIZA	1	
	BUJUMBURA NORD	CIBITOKE	1	
		BUKIRASAZI I	30	
		KINAMA	1	
		BUTERERE I	1	
		BUTERERE II	4	
	BUJUMBURA SUD	MUSAGA/KAMESA	2	
CIBITOKE	CIBITOKE	CIBITOKE	0	
		KAGAZI	1	
		MPARAMBO I	7	
		MPARAMBO II	3	
		MUNYIKA I	2	
		RUKANA I	5	
		RUKANA II	1	
		RUHAGARIKA	1	
		SAMWE	1	
BUJUMBURA	ISARE	KAJAGA	8	
		RUBIRIZI	1	
		RUKARAMU	1	
		GATUMBA	7	1
		MUTIMBUZI	3	
		MARAMVYA	1	
TOTAL			83	1

II.3. Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe

Figure 3 *: Répartition des cas notifies de choléra selon l'âge et le sexe (N=83)*

Parmi les 83 cas de choléra notifiés 51,8% sont de sexe masculin contre 48,2% de sexe féminin. Les patients de 21 à 30 ans sont les plus affectés avec un taux de 22,9% tandis que les enfants de 1-5ans représentent 16,9% des cas notifiés.

II.4. Actions de santé de publique mise en œuvre

- Continuation de la prise en charge de 3 cas hospitalisés aux CTC de l'HPRC et RUGOMBO ;
- Désinfection de 203 ménages des districts sanitaires Cibitoke, Isale et Bujumbura Sud, Bujumbura Nord ;
- Distribution de 50000 litres d'eau par water trucking dans les districts sanitaires Cibitoke et Bujumbura Nord ;
- Sensibilisation porte à porte dans 203 ménages des districts sanitaires Cibitoke, Isale et Bujumbura Nord ;
- Sensibilisation au port de pêche Kajaga ;
- 1road show dans les districts sanitaires Bujumbura Sud;
- Distribution de 2067 aquatabs dans les districts sanitaires Cibitoke, Isale, Bujumbura Sud et Bujumbura Nord ;

II.5. Défis et recommandations

II.5.1. Défis

- Insuffisance de fourniture d'eau potable aux communautés dans les aires de responsabilités affectées du DS de Cibitoke ;
- Faible accès aux installations sanitaires hygiéniques dans les districts sanitaires affectés ;
- Rupture des tests de diagnostics rapide au niveau des laboratoires des districts
- Faible implication des leaders communautaires et les agents de santé communautaires dans la sensibilisation et la surveillance

II.5.2. Recommandations

- Augmenter la fourniture d'eau en fonction de la demande des communautés dans les Districts Sanitaires affectées ;
- Promouvoir la technique de construction des latrines hygiéniques dans les ménages ;
- Mettre en place les latrines hygiéniques dans les lieux publics des différents districts sanitaires ;
- Rendre disponible les tests de diagnostics rapide aux laboratoires des districts sanitaires ;
- Renforcer la capacité du personnel déployé dans les CTC sur la prise en charge des cas ;
- Sensibiliser les leaders communautaires et les agents de santé communautaires dans la surveillance de l'épidémie et le respect des mesures préventives.