



## I. Contexte épidémiologique du Burundi

- ◆ Le Burundi fait face chaque année à des flambées épidémiques de choléra dans certaines localités.
- ◆ Depuis la 48ème semaine épidémiologique de l'année 2022, de cas de choléra ont été rapportés dans les districts sanitaires de Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Sud, Bujumbura centre, Isare, Kabezi, Rwibaga, Mpanda, Bubanza, Mabayi, Rumonge et Bugarama.
- ◆ **A la date du 01 Janvier 2023, l'épidémie a été déclarée.**




Figure 1 : Localisation des districts sanitaires/provinces en épidémie de choléra en 2024

## II. Evolution épidémiologique du choléra

### II.1 Notification des cas

#### Origine des nouveaux cas en date du 02 Juin 2024 : 02 cas

**DS Isare (2 cas) :** Gatumba, P21 :(1cas), Tenga local : (1cas)

Un total de **1892** cas a été déjà notifié depuis le début de l'épidémie. Les districts sanitaires déjà affectés sont **Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Mpanda, Rwibaga, Bubanza, Mabayi, Rumonge et Bugarama.**




Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=1892)

Tableau 2. Origine des cas actifs aux CTC en date du 02 Juin 2024

DISTRICT SANITAIRE	COMMUNE	ZONE	COLLINE D'ORIGINE	NOMBRE DE CAS	CTC
DS BUJUMBURA NORD	NTAHANGWA	Kinama	Bukirasazi 6è av. n°61	4	HPRC
			Bukirasazi 6è av. n°51	1	
DS ISARE	MUTIMBUZI	Gatumba	Muyange II, Pateau 21	1	
	RUBIRIZI	Rubirizi	Nyakiziba/Tenga local	1	RUBIRIZI
TOTAL				7	

## II.2. Distribution par aire de responsabilité des cas notifiés depuis l'épidémie

Les aires de responsabilité qui ont enregistré le plus de cas depuis le début de l'épidémie sont celles de Gatumba (DS Isare), Rubirizi (DS Isare), Buterere I (DS Bujumbura Nord), Kinama (DS Bujumbura Nord), Buyenzi (DS Bujumbura Centre) et Gihosha (DS Bujumbura Nord) avec respectivement **168, 151, 135, 138, 115** et **113** cas confirmés.

Tableau 3 : Répartition des cas par localité affectée en date du 02 Juin 2024

PROVINCE	DISTRICT SANITAIRE	AIRE DE RESPONSABILITE	NOMBRE DES CAS	NOMBRE DE DECES		
BUJUMBURA MAIRIE	BUJUMBURA CENTRE	BUYENZI	115			
		BWIZA	49			
		NYAKABIGA	2			
		ROHERO	5			
		CIBITOKÉ	13			
	BUJUMBURA NORD	KAMENGE	76			
		KINAMA	138			
		BUTERERE I	134	2		
		GIHOSHA	113			
		NGAGARA	4			
		BUTERERE II	91	1		
	BUJUMBURA SUD	MUSAGA	49			
		BUSORO	18			
		KANYOSHA	28	1		
		RUZIBA	2			
CIBITOKÉ		3				
CIBITOKÉ	CIBITOKÉ	KAGAZI	3			
		MPARAMBO I	73			
		MPARAMBO II	34			
		MUNYIKA I	14			
		MUNYIKA II	14			
		RUKANA I	13			
		RUKANA II	86			
		RUHAGARIKA	3			
		RUSORORO	3			
		SAMWE	5			
		RUSIGA	4			
		GABIRO-RUVYAGIRA	6			
		RUBIRIZI	1			
		BUGANDA	3			
		GICACA	6			
		RUVUMERA	1			
		RUGEREGERE	3			
		NYESHENZA	1			
		RUSAGARA	1			
		MABAYI	MABAYI	KAJAGA	14	
				RUBIRIZI	151	1
		BUJUMBURA	ISARE	RUKARAMU	10	
				GAHARAWÉ	50	
				GATUMBA	168	3
				MUTIMBUZI	12	
				GISHINGANO	11	
				MUGERE	1	
MUYANGE I	30					
MUYANGE II	21					
MUSHASHA I	16					
MUSHASHA II	30					
MARAMVYA	9					
GASENYI	3					
KINYINYA I	43					
KINYINYA II	55			2		
KIGARAMANGO	2					
NYABIRABA	1			1		
WARUBONDO	36					
VUGIZO	4					
NYAMBUYE	1					
MUBIMBI	1					
KABEZI	KABEZI		KIYENZI	12		
			RUBIZI	2		
			MUYIRA	7		
			KABUMBA	3		
			GISOVU	3		
			GAKUNGWE	4		
			RUYAGA	12		
			BUHINA	6		
			MBARE	3		
			RWIBAGA	3		
BUBANZA	MPANDA	MUZINDA	2			
		BURINGA	12			
	BUBANZA	BUTANUKA	1			
		GIHANGA	11			
		BUBANZA	4			
RUMONGE	RUMONGE	RUMONGE	3			
		MINAGO	14			
		GATETE	1			
	BUGARAMA	MUTAMBARA	1			
		MUBONE/GITAZA	7			
		MUHUTA	1			
<b>TOTAL</b>			<b>1892</b>	<b>11</b>		

### II.3. Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe




Figure 3 : Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe (N=1892)

Parmi les **1892** cas de choléra déjà notifiés, **54.9%** sont de sexe masculin contre **45.1%** de sexe féminin. Les patients âgés de 21 à 30ans sont les plus affectés, suivis par ceux âgés de 11 à 20 ans et les enfants de moins de 5 ans avec des taux respectifs de **22.3%**, **22.3%** et **17.3%**.

### II.4. Actions de santé publique mises en œuvre en date du 02 Juin 2024

- ◆ Admission de deux (**02**) nouveau cas , l'un au CTC de l'HPRC et l'autre au CTC RUBIRIZI;
- ◆ Prise en charge de cinq (**05**) anciens cas au CTC de l'HPRC ;
- ◆ Déploiement du personnel du COUSP (Médecin et infirmiers) pour appuyer le CTC HPRC dans la prise en charge des cas ;
- ◆ Diffusion des spots radiophoniques sur la prévention du choléra ;
- ◆ Désinfection des ménages touchés couplée à la sensibilisation de la population sur les mesures de prévention contre le choléra ;
- ◆ Recherche active des cas dans les ménages des districts Isare, Bujumbura Centre et Bujumbura Nord ;
- ◆ Aménagement d'une unité de traitement du choléra au CDS Buterere .

## II.5. Défis et recommandations

### II.5.1. Défis

- ◆ Mauvaises conditions d'hygiène dans certaines localités touchées par l'épidémie (District Sanitaire de Bujumbura Mairie Nord) ;
- ◆ Insuffisance des latrines adéquates et correctement utilisées dans les localités touchées par l'épidémie (District Sanitaire de Bujumbura Mairie Nord) ;
- ◆ Les inondations et le débordement de la rivière Rusizi affectant le district Isare ;
- ◆ Inondations de l'Hôpital et CTC Gatumba ;
- ◆ Inondation des quartiers Ouest de la Mairie frontaliers avec Lac Tanganyika.

### II.5.2. Recommandations

- ◆ Améliorer l'accessibilité à l'eau potable pour les populations des localités touchées ;
- ◆ Sensibiliser les ménages à construire des latrines adéquates et à les utiliser correctement ;
- ◆ Poursuivre la sensibilisation de la population sur les signes cliniques, mesures de prévention et conduite à tenir en présence d'un cas de choléra.