

# RAPPORT DE SITUATION SUR L'EPIDEMIE DE CHOLERA

SITREP N° 513

Rédigé et Publié le 11 - Juin - 2024

## MISE A JOUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

CAS PAR DISTRICT	DS Nord	585	Cumul des Cas	Décès	Nouveau: 00
	DS Sud	98			<b>Cumul: 11</b>
	DS Centre	168			
	DS Kabezi	57	1918		
	DS Cibitoke	274		<b>GUERIS</b> <b>Nouveaux :04</b> <b>Cumul guéris: 1903</b>	
	DS Isare	677			
	Ces DS n'ont pas notifié de cas depuis plus de deux mois				
	<b>Cas actifs</b>	DS Mpanda	28	<b>Nouveaux cas: 01</b>	
4	DS Rwibaga	3	<b>DS Bujumbura Nord (1cas): Buterere cellule III .</b>		
	DS Bubanza	2			
	DS Rumonge	18			
	DS Mabayi	1			
	DS Bugarama	7			

Tableau 1. Répartition des cas par centre de traitement cholera (CTC) au 11/06/2024

CTC	NOUVEAUX CAS	ANCIENS CAS	CAS ACTIFS	CAS GUERI
HPRC	1	2	3	3
RUBIRIZI	0	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## I. Contexte épidémiologique du Burundi

- ◆ Le Burundi fait face chaque année à des flambées épidémiques de choléra dans certaines localités.
- ◆ Depuis la 48ème semaine épidémiologique de l'année 2022, de cas de choléra ont été rapportés dans les districts sanitaires de Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Sud, Bujumbura centre, Isare, Kabezi, Rwibaga, Mpanda, Bubanza, Mabayi, Rumonge et Bugarama.
- ◆ **A la date du 01 Janvier 2023, l'épidémie a été déclarée.**




Figure 1 : Localisation des districts sanitaires/provinces en épidémie de choléra en 2024

## II. Evolution épidémiologique du choléra

### II.1 Notification des cas

#### Origine du nouveau cas du 11 Juin 2024 : 01 Cas

##### **DS Bujumbura Nord (1cas): Buterere cellule III**

Un total de **1918** cas a été déjà notifié depuis le début de l'épidémie. Les districts sanitaires déjà affectés sont **Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Mpanda, Rwibaga, Bubanza, Mabayi, Rumonge et Bugarama.**




Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=1918)

Tableau 2. Origine des cas actifs aux CTC en date du 11 Juin 2024

DISTRICT SANITAIRE	COMMUNE	ZONE	COLLINE D'ORIGINE	NOMBRE DE CAS	CTC
<b>BUJUMBURA NORD</b>	NTAHANGWA	Buterere	Buterere Cellule III	1	HPRC
<b>ISARE</b>	MUTIMBUZI	Gatumba	Kinyinya I	1	
	MUBIMBI		Matyazo	Site de déplacés	1
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>	

### II.2. Distribution par aire de responsabilité des cas notifiés depuis l'épidémie

Les aires de responsabilité qui ont enregistré le plus de cas depuis le début de l'épidémie sont celles de Gatumba (DS Isare), Rubirizi (DS Isare), Kinama (DS Bujumbura Nord), Buterere I (DS Bujumbura Nord). Buyenzi (DS Bujumbura Centre) et Gihosha (DS Bujumbura Nord) avec respectivement **169, 156, 140, 137, 115** et **113** cas confirmés.

Tableau 3 : Répartition des cas par localité affectée en date du 11 Juin 2024

PROVINCE	DISTRICT SANITAIRE	AIRE DE RESPONSABILITE	NOMBRE DES CAS	NOMBRE DE DECES		
BUJUMBURA MAIRIE	BUJUMBURA CENTRE	BUYENZI	115			
		BWIZA	50			
		NYAKABIGA	2			
		ROHERO	5			
		CIBITOKÉ	13			
	BUJUMBURA NORD	KAMENGE	76			
		KINAMA	140			
		BUTERERE I	137	2		
		GIHOSHA	113			
		NGAGARA	4			
		BUTERERE II	93	1		
	BUJUMBURA SUD	MUSAGA	49			
		BUSORO	18			
		KANYOSHA	28	1		
		RUZIBA	2			
CIBITOKÉ	CIBITOKÉ	CIBITOKÉ	3			
		KAGAZI	3			
		MPARAMBO I	73			
		MPARAMBO II	34			
		MUNYIKA I	14			
		MUNYIKA II	14			
		RUKANA I	13			
		RUKANA II	86			
		RUHAGARIKA	3			
		RUSORORO	3			
		SAMWE	5			
		RUSIGA	4			
		GABIRO-RUVYAGIRA	6			
		RUBIRIZI	1			
		BUGANDA	3			
		GICACA	6			
		RUVUMERA	1			
		RUGEREGERE	3			
		MABAYI	NYESHENZA	1		
			RUSAGARA	1		
		BUJUMBURA	ISARE	KAJAGA	14	
				RUBIRIZI	156	1
				RUKARAMU	10	
GAHARAWÉ	50					
GATUMBA	169			3		
MUTIMBUZI	12					
GISHINGANO	11					
MUGERE	1					
MUYANGE I	31					
MUYANGE II	21					
MUSHASHA I	16					
MUSHASHA II	30					
MARAMVYA	11					
GASENYI	3					
KINYINYA I	46					
KINYINYA II	55			2		
KIGARAMANGO	2					
NYABIRABA	1			1		
WARUBONDO	36					
VUGIZO	4					
NYAMBUYE	1					
MUBIMBI	2					
KABEZI	KIYENZI			15		
	RUBIZI		2			
	MUYIRA		9			
	KABUMBA		3			
	GISOVU		3			
	GAKUNGWE		4			
	RUYAGA		12			
BUHINA	6					
RWIBAGA	MBARE		3			
BUBANZA	MPANDA		MUZINDA	2		
			BURINGA	12		
		BUTANUKA	1			
	BUBANZA	BUBANZA	4			
RUMONGE	RUMONGE	RUMONGE	3			
		MINAGO	14			
		GATETE	1			
	BUGARAMA	MUTAMBARA	1			
		MUBONE/GITAZA	7			
		MUHUTA	1			
<b>TOTAL</b>			<b>1918</b>	<b>11</b>		

### II.3. Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe




Figure 3 : Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe (N=1918)

Parmi les **1918** cas de choléra déjà notifiés, **54.9 %** sont de sexe masculin contre **45.1 %** de sexe féminin. Les patients âgés de 21 à 30 ans sont les plus affectés, suivis par ceux âgés de 11 à 20 ans et les enfants de moins de 5 ans avec des taux respectifs de **22.4%**, **22.3%** et **17.3%**.

### II.4. Actions de santé publique mises en œuvre en date du 11 Juin 2024

- ◆ Admission d'un **(01)** nouveau cas au CTC de l'HPRC;
- ◆ Poursuite de la prise en charge de trois (03) anciens cas dont deux (02) cas au CTC de l'HPRC et un (01) cas à l'UTC de RUBIRIZI ;
- ◆ Déploiement du personnel du COUSP (Médecin et infirmiers) pour appuyer le CTC HPRC dans la prise en charge des cas ;
- ◆ Diffusion des spots radiophoniques sur la prévention du choléra ;
- ◆ Désinfection des ménages touchés couplée à la sensibilisation de la population sur les mesures de prévention contre le choléra ;
- ◆ Recherche active des cas dans les ménages des districts Isare, Bujumbura Centre et Bujumbura Nord ;
- ◆ Aménagement d'une unité de traitement du choléra au CDS Buterere.

## II.5. Défis et recommandations

### II.5.1. Défis

- ◆ Mauvaises conditions d'hygiène dans certaines localités touchées par l'épidémie;
- ◆ Insuffisance des latrines adéquates et correctement utilisées dans les localités touchées par l'épidémie;
- ◆ Les inondations et le débordement de la rivière Rusizi affectant le district Isare ;
- ◆ Inondations de l'Hôpital et CTC Gatumba.

### II.5.2. Recommandations

- ◆ Améliorer l'accessibilité à l'eau potable pour les populations des localités touchées ;
- ◆ Sensibiliser les ménages à construire des latrines adéquates et à les utiliser correctement ;
- ◆ Poursuivre la sensibilisation de la population sur les signes cliniques, mesures de prévention et conduite à tenir en présence d'un cas de choléra.