

RAPPORT DE SITUATION SUR L'EPIDEMIE DE CHOLERA

SITREP N° 551

Rédigé et Publié le 19 - Juillet - 2024

MISE A JOUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

| CAS PAR DISTRICT | | DS Nord | 601 | Cumul des Cas |  | Décès | Nouveau: 00 |
|---|-------------|---|-----|---|---|-------|-----------------|
|  | | DS Sud | 114 |  | 2067 | | Cumul:12 |
| | | DS Centre | 169 | | | | |
| | | DS Kabezi | 58 |  | GUERIS Nouveaux :00 Cumul guéris: 2051 | | |
| | | DS Isare | 726 | | | | |
| | | DS Ghofi | 51 | | | | |
| | | DS Makamba | 15 | | | | |
| | | <i>Ces DS n'ont pas notifié de cas depuis plus de cinq mois</i> | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cas actifs | | DS C'ibitoke | 274 | Nouveaux cas: 02 | | | |
| 4 | | DS Mpanda | 28 | DS Bujumbura Centre: Buyenzi, Lycée du Lac (1 cas) | | | |
| | | DS Rwibaga | 3 | DS Bujumbura Nord: Buterere, Buterere II, n°22 (1 cas) | | | |
| | | DS Buzanza | 2 | | | | |
| | | DS Rumonge | 18 | | | | |
| | | DS Mabayi | 1 | | | | |
| | DS Bugarama | 7 | | | | | |

Tableau 1. Répartition des cas par centre de traitement cholera (CTC) au 19/07/2024

| CTC | NOUVEAUX CAS | ANCIENS CAS | CAS ACTIFS | CAS GUERI |
|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| HPRC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| RUBIRIZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIHOFI | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 | 0 |

II. Evolution épidémiologique du choléra

II.1 Notification des cas

Origine des nouveaux cas du 19 Juillet 2024 : 02

DS Bujumbura Centre (1 cas): Buyenzi, Lycée du Lac (1 cas)

DS Bujumbura Nord (1cas): Buterere, Buterere II, n°22 (1 cas)

Un total de **2067** cas a été déjà notifié depuis le début de l'épidémie. Les districts sanitaires déjà affectés sont **Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Mpanda, Rwibaga, Bubanza, Mabayi, Rumonge, Bugarama, Gihofi et Makamba.**




Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=2067)

Tableau 2. Origine des cas actifs aux CTC en date du 19 Juillet 2024

| DISTRICT SANITAIRE | COMMUNE | ZONE | COLLINE D'ORIGINE | NOMBRE DE CAS | CTC |
|--------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------|--------|
| GIHOFI | Giharo | Muzye | Nyembuye | 1 | GIHOFI |
| | Bukemba | Bukemba | Gihofi | 1 | |
| Bujumbura Nord | Ntahangwa | Buterere | Buterere II, n°22 | 1 | HPRC |
| Bujumbura Centre | Mukaza | Buyenzi | Buyenzi, Lycée du Lac | 1 | |
| TOTAL | | | | 4 | |

II.2. Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe



Figure 3 : Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe (N=2067)

Parmi les **2067** cas de choléra déjà notifiés, **55.4 %** sont de sexe masculin contre **44.6 %** de sexe féminin. Les patients de tranche d'âge de 11 à 20 ans et 21 à 30 ans sont les plus affectés à un même niveau, suivi des enfants de moins de 5 ans avec des taux respectifs de **22.4%**, **22.1%** et **17.0%**.

II.4. Actions de santé publique mises en œuvre en date du 19 Juillet 2024

- ◆ Admission de deux (02) nouveaux cas au CTC de l'HPRC;
- ◆ Poursuite de prise en charge de deux (02) anciens cas hospitalisés au CTC GIHOFI;
- ◆ Déploiement du personnel du COUSP (Médecin et infirmiers) pour appuyer le CTC HPRC dans la prise en charge des cas ;
- ◆ Diffusion des spots radiophoniques sur la prévention du choléra ;
- ◆ Désinfection des ménages touchés couplée à la sensibilisation de la population sur les mesures de prévention contre le choléra.

II.5. Défis et recommandations

II.5.1. Défis

- ◆ Mauvaises conditions d'hygiène dans certaines localités touchées par l'épidémie ;
- ◆ Insuffisance des latrines adéquates et correctement utilisées dans les localités touchées par l'épidémie ;
- ◆ Les inondations et le débordement de la rivière Rusizi affectant le district Isare ;
- ◆ Inondations de l'Hôpital et CTC Gatumba ;
- ◆ Pas d'infrastructure pour abriter le CTC au DS Gihofi et Makamba ;
- ◆ Manque d'équipements (lits troués) pour la prise en charge des patients ;
- ◆ Exiguïté de l'espace pour l'hospitalisation des cas ;
- ◆ Médicaments pour le traitement des cas présentant des différentes comorbidités non disponible dans les CTC.

II.5.2. Recommandations

- ◆ Améliorer l'accessibilité à l'eau potable pour les populations des localités touchées ;
- ◆ Sensibiliser les ménages à construire des latrines adéquates et à les utiliser correctement ;
- ◆ Poursuivre la sensibilisation de la population sur les signes cliniques, mesures de prévention et conduite à tenir en présence d'un cas de choléra ;
- ◆ Aménager et équiper un CTC à Gihofi et à Makamba ;
- ◆ Rendre disponible les médicaments pour le traitement des cas des comorbidités.