

RAPPORT DE SITUATION SUR L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA

SITREP N° 570

Rédigé et Publié le 07 - Août - 2024

MISE A JOUR DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES


CAS PAR DISTRICT	DS Nord	603	Cumul des Cas 	Décès 	Nouveau: 00
	DS Sud	123			Cumul:12
	DS Centre	169	2097		GUÉRIS Nouveaux : 02 Cumul guéris: 2082
	DS Kabezi	58			
	DS Isare	737			
	DS Gihofi	56			
	DS Makamba	16			
	<i>Ces DS n'ont pas notifié de cas depuis plus de cinq mois</i>				
Cas actifs	DS Cibitoke	274	Nouveaux cas: 00		
	DS Mpanda	28			
3	DS Rwibaga	3	00		
	DS Bubanza	2			
	DS Rumonge	18			
	DS Mabayi	1			
	DS Bugarama	7			
	Originaire de Gihofi, 2 mais en retour de la Tanzanie				

Tableau 1. Répartition des cas par centre de traitement choléra (CTC) au 07/08/2024

CTC	NOUVEAUX CAS	ANCIENS CAS	CAS ACTIFS	CAS GUÉRI
HPRC	0	2	2	2
RUBIRIZI	0	0	0	0
GIHOFI	0	1	1	0
TOTAL	0	3	3	2

I. Contexte épidémiologique du Burundi

- ◆ Le Burundi fait face chaque année à des flambées épidémiques de choléra dans certaines localités.
- ◆ Depuis la 48ème semaine épidémiologique de l'année 2022, des cas de choléra ont été rapportés dans les districts sanitaires de Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Sud, Bujumbura centre, Isare, Kabezi, Rwibaga, Mpanda, Bubanza, Mabayi, Rumonge, Bugarama, Gihofi et Makamba.
- ◆ **A la date du 01 Janvier 2023, l'épidémie a été déclarée.**




Figure 1 : Localisation des districts sanitaires/provinces en épidémie de choléra en 2024

II. Evolution épidémiologique du choléra

II.1 Notification des cas

Origine des nouveaux cas du 07 Août 2024 : 00 Cas

Un total de **2097** cas a été déjà notifié depuis le début de l'épidémie. Les districts sanitaires déjà affectés sont **Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Mpanda, Rwibaga, Bubanza, Mabayi, Rumonge, Bugarama, Gihofi et Makamba.**




Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=2097)

Tableau 2. Origine des cas actifs aux CTC en date du 07 Août 2024

DISTRICT SANITAIRE	COMMUNE	ZONE	COLLINE D'ORIGINE	NOMBRE DE CAS	CTC
BUJUMBURA SUD	Muha	Kanyosha	Ntovuna	1	HPRC
ISARE	Mutimbuzi	Gatumba	Gaharawe	1	
TANZANIE	KASULU	Kasulu	Kigadye	1	GIHOFI
TOTAL				3	

II.2. Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe




Figure 3 : Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe (N=2097)

Parmi les **2097** cas de choléra déjà notifiés, **55.4%** sont de sexe masculin contre **44.6%** de sexe féminin. Les patients de tranche d'âge de 11 à 20 ans et 21 à 30 ans sont les plus affectés à un même niveau, suivi des enfants de moins de 5 ans avec des taux respectifs de **22.3%**, **21.9%** et **17.0%**.

II.4. Actions de santé publique mises en œuvre en date du 07 Août 2024

- ◆ Prise en charge de trois (03) anciens cas dont deux (02) cas hospitalisés au CTC de l'HPRC et un (01) au CTC Gihofi ;
- ◆ Déploiement du personnel du COUSP (Médecin et infirmiers) pour appuyer le CTC HPRC dans la prise en charge des cas ;
- ◆ Diffusion des spots radiophoniques sur la prévention du choléra ;
- ◆ Désinfection des ménages touchés couplée à la sensibilisation de la population sur les mesures de prévention contre le choléra.

II.5. Défis et recommandations

II.5.1. Défis

- ◆ Mauvaises conditions d'hygiène dans certaines localités touchées par l'épidémie ;
- ◆ Insuffisance des latrines adéquates et correctement utilisées dans les localités touchées par l'épidémie ;
- ◆ Médicaments pour le traitement des cas présentant des différentes comorbidités non disponibles dans les CTC.

II.5.2. Recommandations

- ◆ Améliorer l'accessibilité à l'eau potable pour les populations des localités touchées ;
- ◆ Sensibiliser les ménages à construire des latrines adéquates et à les utiliser correctement ;
- ◆ Poursuivre la sensibilisation de la population sur les signes cliniques, mesures de prévention et conduite à tenir en présence d'un cas de choléra ;
- ◆ Rendre disponible les médicaments pour le traitement des cas des comorbidités.